

# Avertissements agricoles



Bulletin n° 14 du 18 juin 1986

Numérotation continue : n° 14

COLZA :

- . Alternaria : raisonnez sur votre parcelle !
- . Pucerons cendrés : les auxiliaires sont là

CEREALES :

- . Blé d'hiver : traitement d'épiaison toujours d'actualité
- . Absence de pucerons

MAIS :

- . Mise en place du réseau

COLZA :- Alternaria :

. **Situation :** Les parcelles où la maladie est présente sur les feuilles de la base ne sont toujours pas à l'abri d'une progression des taches sur les étages supérieurs et les siliques ; les conditions climatiques orageuses lui étant actuellement favorables.

. Préconisations :

- \* Surveiller ces parcelles jusqu'à 3 semaines avant la récolte, période à partir de laquelle il devient inutile d'intervenir.
- \* En cas de début de passage sur siliques, un traitement est vivement conseillé.

- Pucerons cendrés :

Des colonies de pucerons cendrés peuvent être observées en bordure de parcelles.

Tenez compte de la faune auxiliaire (notamment des coccinelles) présente en quantité importante et qui peut suffire à maîtriser une attaque.

N'envisagez un traitement qu'en cas de forte infestation (2 colonies/m<sup>2</sup>) -cas très rare actuellement- avec un produit préservant la faune auxiliaire (type PRIMOR...).

Il devient inutile de traiter 3-4 semaines avant la récolte.

Imprimerie de la Station de Recherches NANCY

Directeur-Gérant D. VERBEKE SERVICE REGIONAL DE LA PROTECTION DES VEGETAUX

Publication Périodique :

CPPAP N° : 1808 2011 AD

Abonnement annuel : 150 F

MINISTERE DE L'AGRICULTURE

Cité Administrative

54043 NANCY CEDEX

Tél : (8) 337.26.45.



p23

## CEREALES :

Les blés sont en épiaison ou devraient y parvenir ces jours prochains. Les orges d'hiver approchent du stade grains pâteux.

. **Situation :** Sur blé, seule la Septoriose est présente. Elle est située au niveau de la 3ème feuille mais se rencontre parfois sur la 2ème feuille (variétés Pernel et Fidel). Le temps chaud et orageux lui est actuellement favorable.

La Rouille brune est absente et l'Oïdium stagne au bas des plantes (le champignon dégénère rapidement et disparaît sous l'effet des orages).

Les pucerons sont absents des cultures de céréales, de nombreux prédateurs (coccinelles notamment) se développent actuellement.

. **Préconisations :** Si vous ne l'avez pas déjà réalisé, traiter les blés contre la Septoriose dès que les épis sont sortis (voir notre bulletin n° 12 du 04 juin 1986).

Il est inutile d'ajouter actuellement un insecticide à votre traitement, ceci ne pourrait être que néfaste pour les prédateurs des pucerons (coccinelles, syrphes...).

## MAIS :

- Quelques cas de dégâts de noctuelles (vers gris) ont été signalés. Actuellement, la période chaude et humide devrait permettre au maïs d'être rapidement à l'abri des attaques de ce parasite. Ne traiter qu'en cas d'absolue nécessité (se reporter au bulletin n° 11 du 28 mai 1986).

- Un réseau d'observations comprenant des cages d'élevage et des pièges sexuels se met actuellement en place. Il permettra d'indiquer la meilleure période d'intervention contre la Pyrale.